

Abstract Meesterstuk Ziekenhuisgeneeskunde - 2016

Titel	Verbetering van herkenning weefseldonoren
Inleiding	Het aantal geëffectueerde weefseldonoren laat de laatste jaren een dalende trend zien in Nederland.
Doel	Achterhalen hoe groot het aantal gemiste weefseldonoren in het ziekenhuis was én het ontwikkelen van een verbeterplan om dit aantal te verlagen.
Methode	Initieel werd een clinical audit verricht om te bepalen of artsen in het ziekenhuis zich aan het locale protocol hielden. Hierna volgde dossieranalyse van alle overleden patiënten in 2014 welke retrospectief werden gescreend op de aanwezigheid van contra-indicaties voor weefseldonatie. De primaire uitkomst was het aantal gemiste weefseldonoren in het ziekenhuis. Na dossieranalyse werd door middel van 3 focusgroepen besproken hoe de kennis en werkbaarheid van het protocol was of verbeterd kon worden. Het uiteindelijke resultaat was een verbeterplan met zowel lokale als nationale adviezen om het percentage gemiste weefseldonoren te verlagen.
Resultaten	Het percentage gemiste weefseldonoren bedroeg 19.1%. Bij deze overleden patiënten waren artsen van 11 specialismen werkzaam, waaronder ziekenhuisartsen in opleiding. De artsen vonden 10 verschillende contra-indicaties aanwezig bij patiënten waarbij de onderzoeker geen contra-indicatie vaststelde. Het percentage correcte herkenning was 65.7% onder alle artsen en 57.1% onder de ziekenhuisartsen in opleiding.
Discussie & Conclusie	De dossieranalyse liet zien dat door artsen genoemde contra-indicaties geen specifieke contra-indicaties voor weefseldonaties waren. Dit illustreert de noodzaak tot betere voorlichting over de contra-indicaties voor weefseldonatie om zodoende het percentage gemiste weefseldonoren te verlagen.